



Système de tracking avec QR CODE et numéro unique

FM Ref Number: 1501-0441-E0E

MÉDECIN

Professeur. nom_1 prenom_1
adresse_1 -
49033 ANGERS CEDEX CEDEX 9 - France

LABORATOIRE

NOM_1
adresse1_1 -
. LUXEMBOURG CEDEX - France

PATIENT

Nom DEMO
Prénom FM_NAFLD
Date de naissance 31/07/1942
Genre Masculin

BIOMARQUEURS


Date de prélèvement: 01/01/2015

Taux Prothrombine	100 %	ASAT	20 UI/L
Acide Hyaluronique	92 µg/L	ALAT	21 UI/L
Plaquettes	215 G/L	Glycémie	5,80 mmol/L
Ferritine	709 µg/L	Poids	73 Kg

Résultats de L'ANALYSE SANGUINE

RÉSULTATS: SCORES & CLASSIFICATION pour la fibrose, la cirrhose & l'activité inflammatoire

RÉSULTATS



Résultats illustrés sous forme de BARGRAPHS pour une meilleure visibilité

INFORMATIONS D'INTERPRETATION

Le package FibroMeterTM NAFLD évalue le stade de fibrose du foie et l'aire de fibrose, chez les patients atteints de stéato-hépatite métabolique. Un algorithme breveté analyse et compare les résultats de 7 marqueurs sanguins en conjonction avec l'âge et le poids du patient pour donner un score (entre 0 et 1) et son équivalence en stade METAVIR, ainsi que l'estimation de l'aire de fibrose. Les résultats doivent être interprétés en fonction du contexte clinique du patient.

¹Le Score METAVIR est un système de notation histologique utilisé pour déterminer la nature et l'étendue de la fibrose hépatique et de l'inflammation.

- F0 = pas de fibrose
- F1 = fibrose portale sans septa
- F2 = fibrose portale avec quelques septa
- F3 = nombreux septa sans cirrhose
- F4 = cirrhose

Informations nécessaires à l'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MISES EN GARDE

Les circonstances suivantes sont susceptibles d'impacter le résultat et/ou l'interprétation des tests FibroMeterTM S:

- Age : patient de moins de 18 ans
- Grossesse
- Hépatite aiguë
- Autre maladie chronique isolée ou associée au foie
- Patients sous traitement interférant (anti-fibrosant, anti-coagulant par AVK)
- Affections sévères ou chroniques non liées au foie entraînant un syndrome inflammatoire tel que l'arthrite
- Insuffisance d'autre organe que le foie, en particulier l'insuffisance rénale
- Toute cause susceptible de faire varier un marqueur en dehors de l'hépatopathie, exemples : pathologie aiguë, injection d'acide hyaluronique...
- Carence ou surcharge (autre que NAFLD) en fer
- Glycémie très instable
- Poids très instable

PRÉCAUTIONS D'USAGE & AVERTISSEMENTS pour une utilisation optimale du test