



Système de tracking avec QR CODE et numéro unique

FM Ref Number: 1503-1203-F0F

MÉDECIN

Professeur. nom_1 prenom_1
adresse_1 -
49033 ANGERS CEDEX CEDEX 9 - France

LABORATOIRE

nom_1
adresse1_1 -
. LUXEMBOURG CEDEX - France

PATIENT

Nom nom_1
Prénom prenom_1
Date de naissance 19/08/1953
Genre Féminin

BIOMARQUEURS


| | | | |
|---|----------|----------------------|----------|
| Date de prélèvement: 02/03/2015 - Date d'examen FibroScan: 11/03/2015 | | | |
| Taux Prothrombine | 100 % | ASAT | 12 UI/L |
| Plaquettes | 120 G/L | A2M | 2,30 g/L |
| GGT | 230 UI/L | Elasticité hépatique | 15,4 kPa |

Résultats de L'ANALYSE SANGUINE

RÉSULTATS: SCORES & CLASSIFICATION pour la fibrose, la cirrhose & l'activité inflammatoire

RÉSULTATS

| | Score | Classification ¹ |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| FibroMètre <small>VCTE</small> | 0,81 | F3 |
| Score de fibrose | | |



Résultats illustrés sous forme de BARGRAPHS pour une meilleure visibilité


INFORMATIONS D'INTERPRETATION

Informations nécessaires à l'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Le FibroMeter™ VCTE évalue le stade de fibrose du foie. Il a spécifiquement été conçu pour les patients atteints d'hépatite chronique virale avec ou sans co-infection VIH ainsi que les porteurs actifs du virus de l'hépatite B. Un algorithme breveté calcule à partir de l'élasticité hépatique mesurée par FibroScan®, de 5 marqueurs sanguins et des données patients (âge, genre), un score (entre 0 et 1) et un stade de fibrose associé basé sur la classification METAVIR. Les résultats doivent être interprétés en fonction du contexte clinique du patient.

¹Classification FibroMeter VCTE™ : Affichage du ou des stades METAVIR prédominants. Se référer au profil de distribution correspondant pour une interprétation complète des résultats.

- F0 = pas de fibrose
- F1 = fibrose portale sans septa
- F2 = fibrose portale avec quelques septa
- F3 = nombreux septa sans cirrhose
- F4 = cirrhose



Distribution des stades METAVIR (en %) pour chaque classe du FibroMeter™ VCTE. (basée sur une population de référence).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MISES EN GARDE

PRÉCAUTIONS D'USAGE & AVERTISSEMENTS pour une utilisation optimale du test

Les circonstances suivantes sont susceptibles d'impacter le résultat et/ou l'interprétation des tests FibroMeter™ VCTE:

- Age : patient de moins de 18 ans
- Grossesse
- Hépatite aiguë
- Autre maladie chronique isolée ou associée au foie
- Patients sous traitement interférant (anti-viral, anti-fibrosant, anti-coagulant par AVK)
- Affections sévères ou chroniques non liées au foie entraînant un syndrome inflammatoire tel que l'arthrite
- Insuffisance d'autre organe que le foie, en particulier l'insuffisance rénale
- Toute cause susceptible de faire varier un marqueur en dehors de l'hépatopathie, exemples : pathologie aiguë, injection d'acide hyaluronique...